

HELIOCUIVRE S - Fungicida

COMPOSIZIONE

Rame metallo puro g 19,94 (=266,4 g/l)
(sotto forma di idrossido)

Coformulanti ed inerti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irricchi di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

ACTION PIN S.A. - 30 Rue Gambetta - DAX (Francia)
Tel. +33 (0)5 58550700

Stabilimento di produzione SIPC - Rue J. Coste
COURCHELLETES (Francia)

Officina di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S.Giovanni (BG)
Reg. Ministero della Salute n° 13521 del 12.04.2010

Distribuito da: **CBC (EUROPE) S.r.l.** - Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362-365079

Riferimento Partita: vedi apposito spazio.

PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Usare occhiali di protezione durante la preparazione della poltiglia. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il periodo di carenza.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

SINTOMI: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

TERAPIA: Gastrolisi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE: HELIOCUIVRE S si presenta sotto forma di soluzione concentrata contenente derivati terpenici estratti dal pino. Questa innovativa formulazione permette a HELIOCUIVRE S d'essere particolarmente efficace contro le Peronospore utilizzando una dose ridotta di rame per ettaro. Il suo utilizzo è pratico e privo di polverosità. HELIOCUIVRE S possiede un elevato potere coprente ed una eccellente adesività. Sulle Batteriosi esplica attività collaterale.

HELIOCUIVRE S può essere utilizzato con qualsiasi apparecchiatura a basso, alto o volume normale (100÷1000 l/ha). HELIOCUIVRE S si utilizza di preferenza a partire dall'allegazione sino a fine stagione. Si utilizza in applicazioni preventive a una cadenza di 8-10 giorni tenendo conto dello sviluppo della vegetazione, della malattia e dei rischi di infezione.

Preparazione della poltiglia: Versare HELIOCUIVRE S nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, poi sempre sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: HELIOCUIVRE S non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati a base di Tiram e Fosetil Alluminio. Per ogni eventuale miscela con altri formulati, è consigliabile effettuare test preliminari di compatibilità. HELIOCUIVRE S è compatibile con HELIOSOUFRE S e le specialità a base di Olii terpenici.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rev. 11-2012



L'APPORTO BIOLOGICO ALLA DIFESA INTEGRATA

HelioCuivre S

FUNGICIDA CUPRICO DI CONTATTO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA



BIOGARD
Division of **CBC (EUROPE)**

Contenuto netto 1000 ml

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

VITE: contro **Peronospora** 225-300 ml/hl (pari a 2,25-3,0 l/ha).

MELO-PERO: contro **Ticchiolatura** prima della fioritura (sospendere i trattamenti ad inizio fioritura) 300 ml/hl di acqua (pari a 3,0 l/ha); contro **Cancri del legno** (*Nectria galligena*, *Phomopsis mali*, *Sphaeropsis malorum*, *Pseudomonas syringae*) trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme 375-525 ml/hl (pari a 3,75 - 5,25 l/ha); contro il **Colpo di fuoco** effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento delle gemme e punti verdi 375 ml/hl (pari a 3,75 l/ha); contro il **Colpo di fuoco del pero** applicare ml 650/ha ogni 5 gg. durante la fioritura (pari a 0,650 l/ha).

ALBICOCCO-SUSINO contro **Corineo**, **Sclerotinia**, **Monilia** (Intervenire solo durante il riposo vegetativo) 375 ml/hl (pari a 3,75 l/ha).

CILIEGIO: contro **Corineo**, **Monilia**, **Scopazzi** (per trattamenti invernali) aggiungere g 120/hl di olio minerale bianco (intervenire durante il riposo vegetativo) 450 ml/hl (pari a 4,5 l/ha).

PESCO-NETTARINE contro **Bolla**, **Corineo** (per trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno) 375 ml/hl (pari a 3,75 l/ha); contro **Monilia** (nella fase dei bottoni rosa) 250 ml/hl (pari a 2,25 l/ha); contro **Batteriosi** (per trattamenti invernali, a caduta foglie ed a fine inverno) 375 ml/hl (pari a 3,75 l/ha).

AGRUMI: contro **Mal secco**, **Allupatura**, **Fumaggine**, **Lebbra**, **Antracnosi** e **Scabbia del limone e dell'arancio** (intervenire prima o dopo la fioritura a seconda della pressione della malattia) 225 ml/hl (pari a 2,25 l/ha).

OLIVO: contro **Occhio di Pavone**, **Fumaggine** e **Lebbra** (intervenire dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura) 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha).

MANDORLO: contro **Corineo**, **Bolla**, **Monilia** (intervenire dopo la caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme) 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha); contro **Batteriosi** (intervenire prima della fase dei bottoni rosa) 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha).

NOCCILO: contro **Batteriosi** (*Xanthomonas corylina*) con due trattamenti in ottobre, distanziati di 20-25 giorni 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha).

NOCE: contro **Antracnosi** (in pre-fioritura) 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha).

NESPOLE: (sospendere i trattamenti ad inizio fioritura) contro **Ticchiolatura** 225 ml/hl (pari a 2,25 l/ha).

ACTINIDIA: contro **Batteriosi** (trattamenti ad ingrossamento gemme e caduta foglie) 200-250 ml/hl (pari a 2,0-2,5 l/ha).

POMODORO-PEPERONE contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Septoria**, **Batteriosi** 300 ml/hl (pari a 3,0 l/ha).

ORTICOLE (fagiolo, pisello, cavolfiore, cavoli di Bruxelles, broccoli, insalate, cardo, carciofo, rapa, ravanello, spinacio, prezzemolo, sedano, finocchio, melanzane, cetriolo, cipolla, aglio): contro **Peronospora**, **Alternaria**, **Batteriosi** (*Xanthomonas* spp., *Pseudomonas* spp.), **Antracnosi**, **Septoria**, **Cercospora** 225 ml/hl (pari a 2,25 l/ha).

FRAGOLA: contro **Vaiolatura** 1,85 l/ha.

SOIA-GIRASOLE: contro **Alternaria**, **Sclerotinia** 300-375 ml/hl (pari a 3,0-3,75 l/ha).

FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro **Ticchiolatura**, **Peronospora**, **Ruggine**, **Antracnosi**, **Batteriosi** 225 ml/hl (pari a 2,25 l/ha).

ORNAMENTALI: contro **Antracnosi**, **Batteriosi**, **Ticchiolatura**, **Peronospora** 225 ml/hl (pari a 2,25 l/ha).

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura, eccetto i casi menzionati nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego". Su pesco, nettarine, susino e varietà di melo (Abbondanza Beldòrd, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduff, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renettà del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fellet, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità potrebbe diventare un problema secondario. Su uva da tavola dopo l'invasiatura il prodotto può causare una leggera marcatura sugli acini.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER FRAGOLA, ORTAGGI. 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smettere le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. In contenitore non può essere svuotato.

Prodotto e marchio registrato

