

ISOMATE A/OFM

per il controllo di
CYDIA MOLESTA (tignola orientale del pesco)
e **ANARSIA LINEATELLA** (anarsia dei fruttiferi)

CARATTERISTICHE

Isomate A/OFM rosso è un diffusore a rilascio controllato del feromone sintetico chimicamente analogo a quello naturale di *Cydia molesta* e *Anarsia lineatella* costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico entrambi pieni del feromone specifico saldati alle estremità e aperti al centro per permettere l'applicazione sulla pianta.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto **PRIMA** delle primissime catture della generazione svernante della tignola orientale del pesco. I diffusori devono essere prima aperti e poi infilati nelle branchetta. Non stringere o forzare eccessivamente l'apertura per evitare la rottura del diffusore.

MONITORAGGI

L'applicazione del metodo della confusione sessuale necessita di frequenti controlli di campo per mantenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione del fitofago e intervenire tempestivamente per abbassare le popolazioni qualora necessario.

Posizionare le trappole di monitoraggio all'interno del frutteto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle settimanalmente. Normalmente si ha un azzeramento quasi totale delle catture.

I controlli in prima generazione sono molto importanti per determinare l'eventuale necessità di un trattamento chimico integrativo.

Nel pesco controllare almeno 500 getti su 10 piante (circa 50 getti/pianta) sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento alla fine dello sviluppo larvale di prima generazione.

Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 2-3%.



pesco



susino

ISOMATE A/OFM



COLTURA

Pesco, susino

INSETTO BERSAGLIO

Tignola orientale del pesco
(*Cydia molesta*)

Tignola del pesco o Anarsia dei fruttiferi
(*Anarsia lineatella*)

DOSAGGIO

1000 diffusori/ha più il rinforzo sui bordi

CONSERVAZIONE

Nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Nel caso di **conservazione in frigorifero** per la stagione successiva, mantenere il materiale a temperatura ambiente per almeno un mese prima dell'applicazione in campo.

COMPOSIZIONE

(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate
(Z)-8-Dodecen-1-ol, (E)-5-Decenyl acetate,
(E)-5-Decen-1-ol

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Xi, R38. irritante per la pelle - R51/53. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NUMERO/DATA REG.

N° 14709 del 11/05/2010

CONFEZIONE

Pacco da 200 diffusori
Cartone da 3.600 diffusori

