

# ISOMATE OFM ROSSO

per il controllo di

**CYDIA MOLESTA** (tignola orientale del pesco)  
e **CYDIA FUNEBRANA** (tignola delle susine)



## CARATTERISTICHE

**Isomate OFM rosso** è un diffusore a rilascio controllato del feromone sintetico chimicamente analogo a quello naturale di *Cydia molesta* costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico di cui uno contenente il filo di alluminio che ne permette l'applicazione e l'altro riempito del feromone specifico.

## APPLICAZIONE

Applicare il prodotto **PRIMA** delle primissime catture della generazione svernante. Attorcigliare in modo lasco i diffusori sulle parti legnose della pianta evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.

## MONITORAGGIO

L'applicazione del metodo della confusione sessuale necessita di frequenti controlli di campo per mantenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione del fitofago e intervenire tempestivamente per abbassare le popolazioni qualora necessario.

Posizionare le trappole di monitoraggio all'interno del frutteto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle settimanalmente. Normalmente si ha un azzeramento quasi totale delle catture.

I controlli in prima generazione sono molto importanti per determinare l'eventuale necessità di un trattamento chimico integrativo. Nel pesco controllare almeno 500 getti su 10 piante (circa 50 getti/pianta) sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento alla fine dello sviluppo larvale di prima generazione.

Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 2-3%.

Nel melo controllare 500 getti oppure 500 frutti sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento. Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 5% nei getti e sullo 0,5% nei frutti.



pesco



susino



melo



pero

# ISOMATE OFM ROSSO



## COLTURA

Pesco, Susino, Melo, Pero

## INSETTO BERSAGLIO

Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*)  
Tignola delle susine (*Cydia funebrana*)

## DOSAGGIO

600 diffusori/ha più il rinforzo sui bordi

## CONSERVAZIONE

Nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Nel caso di **conservazione in frigorifero** per la stagione successiva, mantenere il materiale a temperatura ambiente per almeno un mese prima dell'applicazione in campo.

## COMPOSIZIONE

(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate  
(Z)-8-Dodecen-1-ol

## CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Xi, R38 irritante per la pelle

## NUMERO/DATA REG.

N° 11549 del 20/01/2003

## CONFEZIONE

Pacco da 100 diffusori  
Pacco da 400 diffusori  
Cartone da 5600 diffusori

